



---

# ParcoNotizie

## Newsletter del Parco Delta del Po

---

Regione Emilia-Romagna Programma investimenti 2001/2003 Piano biennale della comunicazione realizzato con il contributo del Ministero dell'Ambiente e del Parco Delta del Po Emilia-Romagna

pagina 1

### **Giannelli per il Parco del Delta del Po Emilia-Romagna**

I personaggi della politica, come uccelli stanziali, si sono ritrovati nel Parco del Delta del Po. Una vignetta del grande disegnatore satirico toscano celebra la prima edizione dell'International Po Delta Birdwatching Fair che si svolge a Comacchio dal 29 aprile al 2 maggio 2004.

pagina 2

### **Attenti a quei sei**

Sono i più ricercati. Sono le vere perle del Delta. Sei uccelli di grande pregio che "catturano" gli amanti del birdwatching. Tutte le informazioni per avvistarli nel Parco del Delta del Po:

- > Marangone minore
- > Spatola
- > Fenicottero
- > Moretta Tabaccata
- > Pernice di Mare
- > Sterna di Ruppell

**International Po Delta Birdwatching Fair**

[www.podeltabirdfair.it](http://www.podeltabirdfair.it)

*Hanno collaborato: Emilio Giannelli, Lucia Felletti.*

*Schede tratte dal "Taccuino ornitologico - Birdwatching nel Parco del Delta del Po Emilia-Romagna", Editrice Compositori, Bologna, 2004*


*Testi: Massimiliano Costa*

*Illustrazioni specie ornitiche: Vittorio Belli.*

aprile 2004



Giannelli per il Parco del Delta del Po Emilia-Romagna



# Attenti a quei sei

I più ricercati. Le vere perle del Delta. Uccelli di grande pregio che “catturano” gli amanti del birdwatching.

## Marangone minore

ordine *Pelecaniformes*

famiglia *Phalacrocoracidae*

corologia *Euroturonica*

### Situazione nel Parco del Delta

Stanziale, nidificante, di passo e svernante. La colonia di nidificazione è situata nel complesso palustre di Punta Alberete e Valle Mandriole, su Salicone.

La prima colonizzazione risale all’inizio degli anni ’80; il numero di coppie è aumentato negli ultimi anni, passando dalle 3-7 coppie della metà degli anni ’90 a quasi 100 nella stagione riproduttiva 2002.

La specie è anche divenuta regolarmente svernante con diverse centinaia di esemplari, raccolti nel dormitorio di Punta Alberete, che fanno del Parco una delle più importanti aree di svernamento.


### Importanza

Il parco ospita la prima colonia italiana regolarmente nidificante, recentemente affiancata da un nucleo nella laguna di Venezia; inoltre, la colonia del Parco rappresenta il sito di nidificazione più occidentale nella distribuzione geografica delle specie.

### Osservazione

Il Marangone minore è presente tutto l’anno; è facilmente osservabile soprattutto nel chiaro del capanno di Punta Alberete, che gli esemplari frequentano per motivi trofici, in particolare nel periodo tra marzo e giugno.

È possibile osservare la specie anche nella Piallassa della Baiona, in particolare nei chiari limitrofi alla Pineta di San Vitale e, più raramente, nella parte meridionale delle Valli di Comacchio.



# Attenti a quei sei

I più ricercati. Le vere perle del Delta. Uccelli di grande pregio che “catturano” gli amanti del birdwatching.

## Spatola

ordine *Ciconiiformes*

famiglia *Treskiornithidae*

corologia *Paleartico-orientale*

### Situazione nel Parco

Specie nidificante, di passo, irregolarmente svernante.

Nidifica principalmente nelle Valli di Comacchio, colonizzate nel 1989, tra la vegetazione alofita in due siti, Boscoforte e Salina; con alcune coppie nidifica anche nella garzaia di Valle Mandriole.

Il numero di coppie è passato da 2 del primo anno alle attuali circa 70. La specie sverna irregolarmente, con pochi esemplari, nelle Valli di Comacchio.

### Importanza

La specie rappresenta una distribuzione puntiforme in tutta Europa ed il Parco ospita l'unica colonia italiana regolarmente nidificante.

### Osservazione

La spatola è osservabile in primavera ed estate, soprattutto nelle zone umide con bassi fondali, frequentate per l'alimentazione. Gruppi di spatole sono facilmente osservabili nelle Valli di Comacchio lungo il percorso sull'argine del Reno e dai capanni di Volta Scirocco, nella Salina di Comacchio, in Valle Mandriole, nella Piallassa della Baiona (chiaro del Comune) e dai percorsi schermati di Valle Santa.



# Attenti a quei sei

I più ricercati. Le vere perle del Delta. Uccelli di grande pregio che “catturano” gli amanti del birdwatching.

## Fenicottero

ordine *Phoenicopteriformes*

famiglia *Phoenicopteride*

corologia *Subcosmopolita*

### Situazione nel Parco

Stanziale, nidificante, di passo e svernante.

La colonia di nidificazione si è insediata dal 2000 nella Salina di Comacchio. Il numero di nidi è aumentato dai 70 iniziali agli 865 del 2003.

La specie è anche regolarmente svernante, soprattutto nelle Valli di Comacchio e nella Salina di Cervia, con centinaia di esemplari.

### Importanza

Il Parco ospita una delle pochissime colonie italiane ed europee regolarmente nidificanti; inoltre la colonia del Parco rappresenta il sito di nidificazione più settentrionale nella distribuzione geografica della specie.

### Osservazione

Il Fenicottero è presente tutto l'anno; è facilmente osservabile soprattutto nella Salina di Comacchio, lungo il percorso in battello dalla stazione Foce delle Valli di Comacchio e, in generale, dalle rive delle Valli e dal percorso ciclabile lungo l'argine del Reno; inoltre è visibile dalla strada Acciaioli che costeggia le Valli Bertuzzi, dal percorso attrezzato che parte dal centro visite della Salina di Cervia e dalle altre strade che costeggiano la zona umida cervese.



# Attenti a quei sei

I più ricercati. Le vere perle del Delta. Uccelli di grande pregio che “catturano” gli amanti del birdwatching.

## Moretta tabaccata

ordine *Anseriformes*

famiglia *Anatidae*

corologia *Euroturanica*

### Situazione del Parco

Stanziale, nidificante, di passo e svernante. La specie nidifica con il principale nucleo nazionale nel complesso palustre di Punte Alberete e Valle Mandriole, che ne costituisce la storica roccaforte italiana con circa 20 coppie.

Coppie sparse hanno nidificato irregolarmente anche nel Bosco della Mesola, nella Valli di Argenta, nelle Valli meridionali di Comacchio.

Sverna con poche decine di esemplari nelle medesime zone umide.

### Importanza

La specie è minacciata di estinzione a livello mondiale; il nucleo del Parco, praticamente concentrato in un solo sito, rappresenta gran parte della popolazione italiana.

### Osservazione

La Moretta Tabaccata è presente tutto l'anno, ma è osservabile soprattutto in primavera, quando il passo di aprile si sovrappone alla prima parte della stagione riproduttiva.

È facilmente osservabile, soprattutto, nel chiaro del capanno di Punte Alberete e lungo il tratto settentrionale del percorso interno alla zona umida, nonché dalla torre di Valle Mandriole.

Nel periodo tra la fine del mese di aprile e la prima metà di maggio è possibile osservare in queste zone umide i voli ed i rituali di corteggiamento, mentre a partire dalla fine di maggio sono presenti le femmine con i pulcini.



# Attenti a quei sei

I più ricercati. Le vere perle del Delta. Uccelli di grande pregio che “catturano” gli amanti del birdwatching.

## Pernice di Mare

ordine *Charadriiformes*

famiglia *Glareolidae*

corologia *Mediterraneo-turanica*

### Situazione nel Parco

Nidificante e di passo. Nidifica in colonie nelle zone fangose aride, nei terreni privi di vegetazione e nelle aree agricole con colture rade.

L'unico nucleo, a volte diviso in due distinte colonie, nidifica tra la bonifica del Mezzano, a ridosso del margine nordoccidentale delle Valli di Comacchio, e la Valle Zavalea. Il numero di coppie è di circa 20-25.

### Importanza

La specie è molto rara e localizzata sul territorio nazionale, dove il piccolo nucleo del Delta rappresenta buona parte dell'intera popolazione nidificante.

### Osservazione

La Pernice di Mare è osservabile da maggio alla fine dell'estate nei dintorni dell'area frequentata per la riproduzione. Con un po' di attenzione, è piuttosto facile osservare le pernici di mare, durante la caccia in volo, lungo la strada dell'argine Agosta, oppure dalla strada che si inoltra nella bonifica del Mezzano dal ponte appena a sud dell'idrovora Fosse, in cui talvolta piccoli gruppi sostano sull'asfalto.

Può essere osservata anche dalla torretta di Valle Zavalea, nei mesi di giugno e luglio.



# Attenti a quei sei

I più ricercati. Le vere perle del Delta. Uccelli di grande pregio che “catturano” gli amanti del birdwatching.

## Sterna di Ruppell

ordine *Charadriiformes*

famiglia *Sternidae*

corologia *Palaartico-paleotropicale-australasiana*

### Situazione nel Parco

Nidificante e di passo. Nidifica con un paio di coppie all'interno di una colonia di Beccapesci sui dossi delle Valli di Comacchio, spostandosi di anno in anno al seguito di questi ultimi (Boscoforte, dossi di Valle Furlana, Carpene).

### Importanza

Il Delta rappresenta l'unico sito di nidificazione di questa specie in Europa, seppur con un numero ridottissimo di coppie.

### Osservazione

La Sterna di Ruppell è molto difficile da osservare, data l'estrema rarità. In pratica, l'unico sito in cui, con un po' di fortuna ed attenzione, è possibile osservare la specie sono le Valli di Comacchio, dal percorso in battello dal casone di Foce, dalla ciclabile lungo l'argine del Reno, dal percorso lungo l'argine di Fosse-Foce, nella Salina di Comacchio.

